

ЛИСТОК-ВКЛАДЫШ – ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ПАЦИЕНТА**Тимоген®****0,05 % крем для наружного применения**

Действующее вещество: альфа-глутамил-триптофан

- Перед применением препарата полностью прочитайте листок-вкладыш, поскольку в нем содержатся важные для Вас сведения.
- Всегда применяйте препарат в точности с листком-вкладышем или рекомендациями лечащего врача, или работника аптеки.
- Сохраните листок-вкладыш. Возможно, Вам потребуется прочитать его еще раз.
- Если Вам нужны дополнительные сведения или рекомендации, обратитесь к работнику аптеки.
- Если у Вас возникли какие-либо нежелательные реакции, обратитесь к лечащему врачу или работнику аптеки. Данная рекомендация распространяется на любые возможные нежелательные реакции, в том числе на не перечисленные в разделе 4 листка-вкладыша.
- Если состояние не улучшается или оно ухудшается, через 20 дней, Вам следует обратиться к врачу.

Содержание листка-вкладыша

1. Что из себя представляет препарат Тимоген®, и для чего его применяют.
2. О чем следует знать перед применением препарата Тимоген®.
3. Применение препарата Тимоген®.
4. Возможные нежелательные реакции.
5. Хранение препарата Тимоген®.
6. Содержимое упаковки и прочие сведения.

1. ЧТО ИЗ СЕБЯ ПРЕДСТАВЛЯЕТ ПРЕПАРАТ ТИМОГЕН®, И ДЛЯ ЧЕГО ЕГО ПРИМЕНЯЮТ

Препарат Тимоген® содержит действующее вещество альфа-глутамил-триптофан и относится к иммуностимулирующим средствам.

Показания к применению

Тимоген® показан к применению в составе комплексной терапии:

- атопического дерматита, в т.ч. осложнённого вторичной бактериальной инфекцией;
- хронической экземы (истинной и микробной);
- хронической пиодермии, в т.ч. хронической диффузной стрептодермии;

- механических, термических и химических травм кожных покровов.

Если улучшение не наступило или Вы чувствуете ухудшение через 20 дней, необходимо обратиться к врачу.

2. О ЧЕМ СЛЕДУЕТ ЗНАТЬ ПЕРЕД ПРИМЕНЕНИЕМ ПРЕПАРАТА ТИМОГЕН®

Противопоказания

Не принимайте препарат Тимоген®, если у Вас аллергия на альфа-глутамил-триптофан или любые другие компоненты препарата (перечисленные в разделе 6 листка-вкладыша).

Особые указания и меры предосторожности

Перед применением препарата Тимоген® проконсультируйтесь с лечащим врачом или работником аптеки. Следует избегать попадания препарата в глаза, рот и на другие слизистые оболочки. При случайном попадании препарата на слизистые оболочки, необходимо промыть их водой.

Другие препараты и препарат Тимоген®

Сообщите лечащему врачу или работнику аптеки о том, что Вы применяете, недавно применяли или можете начать применять какие-либо другие препараты.

При лечении атопического дерматита тимогеном уменьшается потребность (снижается кратность приема и дозы, вплоть до полной отмены) в применении антигистаминных препаратов и топических глюкокортикостероидов.

Беременность и грудное вскармливание

Если Вы беременны или кормите грудью, думаете, что забеременели, или планируете беременность, перед началом применения препарата проконсультируйтесь с лечащим врачом или работником аптеки. Применение препарата Тимоген® в период беременности и грудного вскармливания противопоказано.

Управление транспортными средствами и работа с механизмами

Тимоген® не влияет на способность управлять транспортными средствами и заниматься другими потенциально опасными видами деятельности, требующими повышенной концентрации внимания и быстрой психомоторных реакций.

Препарат Тимоген® содержит спирт стеариловый, спирт цетиловый

Препарат Тимоген® содержит спирт стеариловый, спирт цетиловый, которые могут вызвать местные кожные реакции (например, контактный дерматит).

Препарат **Тимоген®** содержит метилпарагидроксибензоат, пропилпарагидроксибензоат

Препарат Тимоген® содержит метилпарагидроксибензоат, пропилпарагидроксибензоат, которые могут вызвать аллергические реакции (в том числе, отсроченные).

3. ПРИМЕНЕНИЕ ПРЕПАРАТА ТИМОГЕН®

Всегда применяйте препарат в полном соответствии с листком-вкладышем или с рекомендациями лечащего врача, работника аптеки. При появлении сомнений посоветуйтесь с лечащим врачом или работником аптеки.

Рекомендуемая доза

Рекомендуемая суточная доза – 2 г крема (1 мг тимогена). Полоса крема из тубы диаметром 5 мм длиной 4 см имеет массу 1 г.

Путь и (или) способ введения

Наружно. Препарат наносят тонким слоем на поражённое место 1–2 раза в сутки (утром и/или вечером). После нанесения крема поражённое место не следует закрывать повязкой.

Продолжительность терапии

Продолжительность курса – до стихания местных проявлений заболевания. Максимальная продолжительность курса – 20 суток.

Если вы применили препарата Тимоген® больше, чем следовало

Случаи передозировки не описаны. Экспериментально доказано, что тимоген не токсичен в дозах, превышающих терапевтическую дозу в тысячи раз.

При наличии вопросов по применению препарата обратитесь к лечащему врачу или работнику аптеки.

4. ВОЗМОЖНЫЕ НЕЖЕЛАТЕЛЬНЫЕ РЕАКЦИИ

Подобно всем лекарственным препаратам препарат может вызывать нежелательные реакции, однако они возникают не у всех.

При применении препарата Тимоген® в редких случаях возможны аллергические реакции на вспомогательные вещества.

Сообщение о нежелательных реакциях

Если у Вас возникают какие-либо нежелательные реакции, проконсультируйтесь с врачом или работником аптеки. Данная рекомендация распространяется на любые возможные нежелательные реакции, в том числе на не перечисленные в листке-вкладыше. Вы также

можете сообщить о нежелательных реакциях напрямую в АО «МБНПК «Цитомед» (www.cytomed.ru, тел.: 8 (800) 505-03-01, электронная почта: farmakonadzor@cytomed.ru). Сообщая о нежелательных реакциях, Вы помогаете получить больше сведений о безопасности препарата.

5. ХРАНЕНИЕ ПРЕПАРАТА ТИМОГЕН®

Храните препарат в недоступном для ребёнка месте так, чтобы ребёнок не мог увидеть его. Не применяйте препарат после истечения срока годности (срока хранения), указанного на тубе и картонной пачке после «Годен до». Датой истечения срока годности является последний день данного месяца.

Хранить при температуре от 2 °С до 8 °С.

Не выбрасывайте препарат в канализацию. Уточните у работника аптеки, как следует утилизировать (уничтожить) препарат, который больше не потребуется. Эти меры позволят защитить окружающую среду.

6. СОДЕРЖИМОЕ УПАКОВКИ И ПРОЧИЕ СВЕДЕНИЯ

Препарат Тимоген® содержит

Действующим веществом является альфа-глутамил-триптофан. В 100 г крема содержится 0,05 г альфа-глутамил-триптофана (в виде альфа-глутамил-триптофана натрия).

Прочими ингредиентами (вспомогательными веществами) являются: парафин жидкий, вазелин, полисорбат-60 (полиоксиэтилен сорбитан моностеарата-60), глицерол, сорбитана стеарат, стеариловый спирт, цетиловый спирт, диэтиленгликоля моноэтиловый эфир, метилпарагидроксибензоат (нипагин, E218), камедь ксантановая, пропилпарагидроксибензоат (нипазол, E216), вода очищенная.

Внешний вид препарата Тимоген® и содержимое упаковки

Крем для наружного применения 0,05 %. Белый или белый с желтоватым оттенком крем. По 20 г или 30 г в тубах алюминиевых с контролем первого вскрытия (мембраной) и бушоном. По одной тубе вместе с листком-вкладышем в пачке из картона.

Держатель регистрационного удостоверения и производитель

Акционерное общество «Медико-биологический научно-производственный комплекс «Цитомед» (АО «МБНПК «Цитомед»).

Россия, г. Санкт-Петербург, Орлово-Денисовский проспект, д. 14, строение 1.

Тел.: 8 (800) 505-03-01.

Адрес электронной почты: farmakonadzor@cytomed.ru

СООТВЕТСТВУЕТ ЭКСПЕРТНОМУ ОТЧЕТУ
от 13.02.2023 № 2693
(ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 0001)

За любой информацией о препарате, а также в случаях возникновения претензий следует обращаться к держателю регистрационного удостоверения – АО «МБНПК «Цитомед».

Листок-вкладыш пересмотрен